




KARMIDŁO BUTTERFLY INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


Obsługa i zarządzanie podajnikiem Butterfly® jest bardzo łatwe. Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, a zapewnisz sobie najwyższą wydajność i oszczędność kosztów.

BARDZO WAŻNE




Ryc. 1

A. Dno karmidła powinno tylko dotykać ściółki. Unikaj wywierania na tacę podajnika jakiegokolwiek ciężaru lub nacisku skierowanego z góry. (Ryc. 1)




Ryc. 2

B. Nigdy nie ustawiaj podajników szerszej niż pozycja 8, z wyjątkiem opróżniania tac podajnika między cyklami produkcyjnymi. (Ryc. 2)



Ryc. 3

C. Nigdy nie obracaj regulatora stopnia otwarcia karmideł podczas regulacji szerokości tacy więcej niż o dwa kliknięcia dziennie. (Ryc. 3)




Ryc. 4

D. Tace podajnika muszą pozostać całkowicie otwarte przez cały okres między cyklami produkcyjnymi. (Ryc. 4)

E. Upewnij się, że pasza jest zawsze obecna na tacy podczas pierwszych trzech dni po wstawieniu piskląt. Zapobiega to wciągnięciu młodych piskląt w przestrzeń między dozownikiem a tacą.

PRZED WSTAWIENIEM PISKŁAŁ

1. Z tacami podajnika ustawionymi dnem co najmniej 20 centymetrów od ściółki, wykonaj następujące czynności:



Ryc. 5

- Ustaw wszystkie tace podajnika w pozycji 0. Wskaźnik poziomów otwarcia umieszczony jest na naklejce na tacy podajnika. (Ryc. 5)
- Uruchom zasyp, tak aby wszystkie karmidła na linii wypełniły się paszą. (Ryc. 5)

2. Opuść tace podajnika, aż spody tac dotkną ściółki.


PODZAS CYKLU PRODUKCYJNEGO – OD PIERWSZEGO DNIA DO WYWOZU PTAKÓW DO UBOJU

1. Wysokość tacy:


- Obserwuj ptaki podczas pobierania paszy.
- Opuść lub podnieś linię karmienia tak, aby grzbiet ptaka był nieco wyżej niż jego głowa podczas pobierania paszy.
- Reguluj wysokość tacy co najmniej dwa do trzech razy w tygodniu.

2. Pozycja podajnika:

- Użyj regulatora stopnia otwarcia karmideł, aby otwierać i zamykać tace Butterfly. (Ryc. 6)
- Zauważ naklejkę wskaźnikową na karmidle, które podpięte jest do regulatora stopnia otwarcia karmideł.
- Zaczynając od pozycji 0 dla jednodniowych piskląt otwieraj tace w ciągu cyklu produkcyjnego, jak pokazano na poniższych ilustracjach.
- Nigdy nie ustawiaj podajnika wyżej niż pozycja 8 podczas cyklu produkcyjnego.



Ryc. 6



Ryc. 7

DZIEŃ WYWOZU PTAKÓW DO UBOJU

1. Wyłącz system zadawania paszy przed usunięciem ptaków z kurnika i pozwól im opróżnić tace z paszy.
2. Po opróżnieniu otwórz tace jak najszerzej i wciągnij do wysokości pokazanej na rysunku 8 (zobacz na odwrocie).
3. Pozwól ptakom na zjedzenie pozostałości paszy z całkowicie otwartych tac przez co najmniej 2-3 godziny. Ponownie – trzymaj tace całkowicie otwarte (nie zamykaj ich), dopóki nie uruchomisz podajników dla kolejnego stada.

Uwaga:


Zalecamy, abyś początkowo używał naszych wskazówek dotyczących użytkowania, ale jeśli uznasz, że Twoja sytuacja (dawki paszy, typ ptaka itp.) wymaga nieco innych ustwień zarówno co do wysokości tacy, jak i pozycji tacy, możesz modyfikować zalecenia.

WAŻNE Nie należy dopuścić do nacisku skierowanego z góry na podajniki i tace na posadzce.



Tydzień 1


Pozycja podajnika: **0 - 1**
Wysokość podajnika: Tace tylko dotykają ściółki




Tydzień 2

Pozycja tacy: **2**


➔
Kontynuacja
na następnej
stronie




Tydzień 3 Pozycja tacy: **3**




Tydzień 4 Pozycja tacy: **4**




Tydzień 5 Pozycja tacy: **6**



Tydzień 6 Pozycja tacy: **7**



Tydzień 7 Pozycja tacy: **7 - 8**



WAŻNE: Podajniki muszą pozostać całkowicie otwarte przez cały okres między cyklami produkcyjnymi.

Ryc. 8

Tydzień 8 między cyklem produkcyjnym
Pozycja tacki: całkowicie otwarta



BUTTERFLY
CONCEPTS

Butterfly Concepts, LLC.
info@butterflyconcepts.com